

**日曹** **イトフィン** フロアブル  
ETHOFIN

登録番号 第23436号  
種類名 エタボキサム水和剤  
ethaboxam  
殺菌剤分類 22  
性状 類白色水和性粘稠懸濁液体  
有効年限 4年

有効成分 エタボキサム 12.5%  
毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
包装 500mℓ×20本、1ℓ×12本(北海道限定)

### ■特長

1. 独自の作用機構であるので、耐性菌管理を目的としたローテーション剤として最適です。
2. 使用成分数を低減することができる一成分剤です。
3. 優れた根からの吸収移行があります。



### ■適用病害名及び使用方法

(2024年6月20日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	エタボキサムを含む農薬の総使用回数	使用方法
ばれいしょ	疫病	500～750	100～300	収穫7日前まで	4回以内	4回以内	散 布
はくさい	べと病	3回以内			4回以内 (全面土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)		
キャベツ ブロッコリー レタス 非結球レタス				3回以内			
トマト		疫病		4回以内	4回以内		
きゅうり	べと病	200～700		収穫7日前まで	4回以内	4回以内	
ぶどう							

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	エタボキサムを含む農薬の総使用回数	使用方法
		薬量(ℓ/10a)	希釈水量(ℓ/10a)				
はくさい	根こぶ病	1.0～1.5	100～150	定植前	1回	4回以内 (全面土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)	全面処理後 土壌混和

### ⚠ 効果・薬害などの注意

1. 薬剤耐性菌の出現回避のため、過度の連用をさげ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
2. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

### ⚠ 安全使用上の注意

3. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
4. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

**水産動植物への影響：**使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

**保管：**密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

---

**【農薬をご使用の際は】**

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。